

Профилактика бешенства, рекомендации.

По данным ВОЗ бешенство распространено на территориях большинства стран мира. Ежегодно в мире от бешенства умирает десятки тысяч человек, причем 40% из них – дети до 15 лет.

В Республике Беларусь ежегодно регистрируются случаи бешенства среди диких (лисы, енотовидные собаки, волки и др.), домашних (собаки, кошки) и сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот), поэтому существует риск возникновения случаев бешенства среди населения, которое контактирует с данными животными в быту.

Бешенство – это инфекционная болезнь с преимущественным поражением центральной нервной системы, сопровождающаяся судорогами, спазмами глоточной и дыхательной мускулатуры, со смертельным исходом.

Когда вирус поражает центральную нервную систему и появляются клинические симптомы, бешенство приводит к летальному исходу в 100% случаев.

Вирус бешенства, содержится в слюне больного животного. При укусе вместе со слюной вирус попадает в рану. Очень опасно попадание слюны больного животного на слизистые оболочки глаз, рта, носа, а также на кожу, где могут быть невидимые простым глазом повреждения. Среди людей заболевания бешенством распространяют обычно домашние животные. Особую опасность представляют бродячие собаки и кошки.



Профилактика бешенства.

Профилактика бешенства заключается в ликвидации заболеваемости бешенством среди животных и предупреждении болезни у людей, подвергшихся укусам инфицированных животных.

Основной мерой профилактики считается прививка от бешенства всех домашних и бродячих животных.

В целях предупреждения заражения бешенством необходимо:

- ✚ минимизировать контакты с бродячими и дикими животными, особенно проявляющими агрессию;
- ✚ не покупать животных «с рук», без наличия соответствующих документов;
- ✚ делать домашним животным положенные профилактические прививки;
- ✚ при заболевании животного, либо при появлении симптомов, не исключаящих бешенство, обращаться к ветеринарному специалисту для установления 10 дневного наблюдения за животным или выяснения причины его смерти;
- ✚ запрещается приносить домой диких животных, если вы хотите оказать помощь, отвезите сразу к ветеринару.

Как правило, здоровые дикие животные избегают встречи с человеком. И если такое животное появляется в населенном пункте, можно предположить, что оно больно бешенством.

Нужно принять все меры личной предосторожности и обеспечения безопасности для себя и своих близких;

- ✚ не рекомендуется забирать с улицы бездомных либо больных животных, но если взяли, то найти возможность в короткий срок показать питомца

ветеринарному врачу и сделать ему профилактическую прививку против бешенства.

Меры профилактики бешенства обязательны для всех возрастных групп населения, но особенно важно объяснить их детям и подросткам. Они часто проявляют интерес к бездомным животным, а потому находятся в группе риска. В случаях, когда контакта с животным не удалось избежать (оцарапывание, укус, ослюнение), необходимо:

- провести первичную обработку места контакта – тщательно и длительно (не менее 15 минут) промыть струей воды с мылом;
- при наличии раны – после промывания с мылом обработать края раны 5% настойкой йода, или любым другим антисептиком;
- наложить стерильную повязку и как можно быстрее (в течение суток после контакта) обратитесь в медицинское учреждение.



Прививки эффективны только в том случае, если их начинать не позднее 14 дней от момента укуса.

Прививки проводятся:

- **по безусловным показаниям** в случае, если укусило бешенное животное или диагноз укусившего животного неизвестен, назначается и проводится 6 прививок - на 1, 3, 7, 14, 30 и 90 дни;
- **по условным показаниям** в случае, если укусило животное без признаков бешенства, и за этим животным, помещенным на карантин, ведется наблюдение течение 10 дней, при таких условиях проводится 3 прививки - 1, 3, 7 дни и курс прививок заканчивается.
- Только врач (хирург, травматолог) может оценить риск возможного заражения вирусом бешенства и назначить, при необходимости, прививочный курс.

В результате введения антирабической вакцины редко наблюдаются местные реакции в виде болезненности, отека и уплотнения, общее недомогание, повышение температуры, увеличение лимфоузлов, артриты, расстройства пищеварения. Перерыв в прививках на 1-2 дня и прием жаропонижающих ликвидирует симптомы.

Помните, что своевременное проведение комплекса прививок против бешенства – это единственное средство спасти пострадавшего от неминуемой смерти.

Недопустимы самовольные перерывы в проведении вакцинации, прекращение или сокращение курса, иначе прививки будут неэффективны.